



INDICAZIONI POST TRATTAMENTI CONSERVATIVI

1. ALIMENTAZIONE

- Evitare l'assunzione di alimenti e di sostanze che tendono a pigmentare, come caffè, tè, frutti di bosco, fumo, ecc.. e che quindi potrebbero compromettere il colore dell'elemento ricostruito, almeno nelle prime 48 ore.

2. DOLORE

- Nei giorni successivi al trattamento potrebbe presentarsi una transitoria sensibilità dovuta alla tecnica di isolamento mediante diga e/o alle procedure di lucidatura dell'otturazione stessa, è del tutto normale; nei casi in cui il dolore dovesse persistere oltre le 24 ore è preferibile contattare il dottore.

3. RESTAURI FRONTALI

- Potrebbe ritenersi necessario, in caso di restauri nei settori frontali, rivedere l'integrazione del colore dopo la reidratazione del dente per poter eventualmente reintervenire con piccole correzioni.

4. OCCLUSIONE

- Nel caso di interventi di restauri estesi o multipli nella stessa zona, nei giorni successivi potrebbe presentarsi una leggera dolenza alla pressione risolvibile con un mirato ritocco occlusale.

5. CONTROLLI PERIODICI

- Fondamentale è controllare periodicamente i margini delle otturazioni con supporti radiografici ed esame visivo diretto con ingrandimenti; controlli che verranno concordati direttamente con il dottore